

BIENVENIDO A NUESTRA CLÍNICA DE STD



Nuestro objetivo durante esta clínica es ofrecer pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual. Por favor marque las pruebas o tratamiento que desee obtener hoy (puede encontrar información acerca de las infecciones en el dorso de esta página). Si tiene acceso a Internet, puede obtener más información sobre enfermedades de transmisión sexual (STD, por sus siglas en inglés) en <http://www.ashastd.org>.

Ofrecemos pruebas de:

- Clamidia,
- Gonorrea,
- Sífilis (análisis de sangre), y
- VIH (el virus que causa el SIDA)*.

Ofrecemos tratamiento para las siguientes STD:

- Clamidia,
- Gonorrea,
- Inflamación pélvica,
- Sífilis,
- Infecciones vaginales (hongos, vaginitis bacteriana, tricomoniasis),
- Verrugas genitales (HPV),
- Piojos púbicos (ladilla),
- Molusco contagioso, y sarna.

*Nuestras **pruebas de VIH** pueden ser llevadas a cabo por vía oral, y los resultados estarán disponibles hoy en 20 minutos. También ofrecemos un análisis de sangre, pero los resultados del mismo estarán disponibles en dos semanas y debe venir en persona para recibirlos (no se hacen excepciones).



ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ASEGURARSE DE NO TENER PROBLEMAS DURANTE SU VISITA



- **Hágale saber a la persona de la recepción si desea una prueba de VIH solamente. Esto acelerará las cosas.**
- **Sepa que no ofrecemos pruebas de Papanicolaou ni evaluaciones de herpes.**
- **Las pruebas y tratamientos son gratuitos.**
- **Sólo nos pondremos en contacto con usted si padece una infección que deba ser tratada.**
- **¡Por favor no use el baño hasta haber visto al médico! Si usa el baño, puede que no sea posible hacerse ciertas pruebas.**

ENFERMEDAD	SÍNTOMAS	¿CÓMO SE CONTAGIA?	TRATAMIENTO
Clamidia	Entre 7 y 21 días luego de la infección Supuraciones del pene o la vagina Dolor o ardor al orinar Dolor en la parte inferior del abdomen Puede que NO HAYAN SÍNTOMAS Puede causar enfermedad inflamatoria de la pelvis (PID, por sus siglas en inglés) si no se la trata	Contacto sexual (vaginal, oral o anal) con alguien que padece clamidia Una madre puede transmitírsela a su bebé durante el parto	Antibióticos recetados por un médico Las parejas sexuales también deben ser tratadas
Piojos púbicos (ladilla)	De inmediato o a los pocos días Picazón intensa en el área genital Evidencia visible de ladilla	Contacto personal cercano con alguien que padece ladilla Compartir artículos de uso personal (toallas, sábanas) con alguien que esté infectado con ladilla o huevos de ladilla	Medicamentos recetados y de venta libre (cremas, lociones o champú) Deben lavarse completamente las sábanas, toallas, etc.
Verrugas genitales (HPV)	Entre 3 y 6 meses luego de la infección A veces puede que no sean visibles Bultos pequeños que sobresalen en los órganos sexuales o el ano, o alrededor de éstos Pueden estar dentro de la vagina Pueden variar en color y tamaño Pueden causar cáncer de cuello uterino en las mujeres. Se recomiendan pruebas anuales de Papanicolaou para detectar las verrugas	Contacto sexual de piel a piel (vaginal, oral o anal) con una persona que padece verrugas genitales Una madre puede transmitírsela a su bebé durante el parto Todavía se desconoce mucho acerca del virus Entre el 70 y el 85 por ciento de las personas sexualmente activas están infectadas	Un médico puede quitar las verrugas genitales, pero éstas pueden aparecer nuevamente
Gonorrea	Entre 2 y 10 días luego de la infección A veces NO HAY SÍNTOMAS Dolor o ardor al orinar Supuraciones del pene o la vagina Dolor intenso de garganta Los hombres tienen más probabilidades de tener síntomas que las mujeres Puede causar enfermedad inflamatoria de la pelvis (PID, por sus siglas en inglés) si no se la trata	Contacto sexual (vaginal, anal u oral) Una madre puede transmitírsela a su bebé durante el parto	Antibióticos recetados por un médico (píldoras o inyecciones) Sus parejas sexuales también deben ser tratadas
VIH/SIDA	Pueden pasar entre 10 y 12 años luego de la infección antes de tener síntomas Entre los síntomas se encuentran la fiebre, los sudores nocturnos, baja de peso sin otra explicación, diarrea, glándulas linfáticas inflamadas	Contacto sexual (vaginal, oral o anal) Intercambio de sangre, semen, líquido pre-eyaculatorio o fluidos vaginales con una persona infectada Compartir agujas Una madre puede transmitírsela a su bebé antes del parto o durante el mismo, o mediante la leche materna	NO HAY CURA Medicamentos recetados ayudan a aminorar el paso del VIH y a tratar las infecciones causadas por el debilitamiento del sistema inmunológico
Uretritis no gonocócica (NGU)	Entre 2 y 21 días luego de la infección Supuraciones del pene o la vagina Dolor o ardor al orinar Dolor en la parte inferior del abdomen A veces NO HAY SÍNTOMAS	Contacto sexual (vaginal, anal u oral) Una madre puede transmitírsela a su bebé durante el parto	Se cura con antibióticos recetados por un médico Sus parejas sexuales también deben ser tratadas
Sífilis	1 ^{ra} etapa: entre 1 y 12 semanas luego de la infección Una llaga indolora en cualquier lugar del área genital o la boca 2 ^{da} etapa: entre 2 y 12 semanas luego de que la llaga se haya sanado, pueden aparecer sarpullidos en la piel y síntomas similares a los de la gripe 3 ^{ra} etapa: latencia (sin síntomas)	Contacto sexual (vaginal, anal u oral) con alguien que padece sífilis Una madre puede transmitírsela a su bebé durante el parto	Medicamentos antibióticos recetados Las parejas sexuales deben ser evaluadas y tratadas si están infectadas
Vaginitis (BV, hongos, tricomoniasis)	Normalmente picazón, dolor y ardor en la vagina Supuraciones anormales de la vagina que pueden tener olor	Puede transmitirse durante el contacto sexual Los hombres pueden portar los gérmenes sin tener síntomas	Hongos: medicamentos recetados o de venta libre Tricomoniasis: medicamentos recetados. Las parejas deben ser tratadas BV: antibióticos recetados