

የሚከተለውን በተመለከተ ለተቀባዮችና ተንከባካቢዎች የቀረበ የክትባት ዝርዝር መረጃ መስጫ ቅጽ የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019ን (COVID-19) ለመከላከል ስለሚሰጡት ስለ SPIKEVAX (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባት እና ሞደርና የCOVID-19 ክትባት ባይቫለንት/ BIVALENT (አራጅናል እና ኦሚክሮን BA.4/BA.5) በተመለከተ

ዕድሜያቸው 6 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ

በSARS-CoV-2 ምክንያት የሚመጣውን የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019ን (COVID-19) ለመከላከል የሚሰጡት SPIKEVAX (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent (አራጅናል እና ኦሚክሮን BA.4/BA.5)፣ ከዚህ በኋላ ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ተብሎ የሚጠራው ለእርስዎ ወይም ለልጅዎ ቀርቦውልዎታል።

ይህ የተከታቢዎችና ተንከባካቢዎች የመረጃ መስጫ ቅጽ የተፈቀደውን የሞደርና የCOVID-19 ክትባትን እና ዕድሜያቸው 6 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች እንዲሰጥ የተፈቀደውን የሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalentን የመረጃ መስጫ ቅጽ እንዲሁም ዕድሜያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች እንዲሰጥ በFDA-የተፈቀደውን የSPIKEVAX ክትባትን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA) እና ትእዛዝ 1ን የተመለከተ መረጃ ይይዛል።¹

በFDA የተፈቀደው SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) እና በአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ (EUA) ስር እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች የተፈቀደው ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ቀመሮች በየራሳቸው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ጥቅም ላይ ሲውል በተቀያይሪነት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።²

የ SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) በሞደርና (Moderna) የተመረተ እና በFDA-የተፈቀደ የCOVID-19 ክትባት ነው። ክትባቱ ዕድሜያቸው 18 አመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች COVID-19ን ለመከላከል በሁለት ተከታታይ ዶዝ እንዲሰጥ የተፈቀደ ክትባት ነው። ክትባቱ በተጨማሪም በEUA ስር የሚከተሉትን እንዲያቀርብ ተፈቅዷል፡

- ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት እስከ 17 ዓመት ለሆኑ ሰዎች በሁለት ዶዝ የመጀመሪያ ተከታታይ ክትባት፤ እና
- ዕድሜያቸው 12 አመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ የሰውነታቸው የበሽታ መከላከል አቅም በተወሰነ ደረጃ ተዳክሟል ተብለው ለሚወሰዱ ሰዎች ሶስተኛ የመጀመሪያ ተከታታይ ዙር ክትባት ለመስጠት።

¹ የልጅዎ እድሜ 5 ዓመት ቢሆንም እንኳ፣ ይህን የመረጃ ቅጽ ሲያገኙ ይችላሉ። በመጀመሪያው ዶዝ የወሰዱት ምንም አይነት ዶዝ ቢሆን፣ በሁለት ዶዎች በሚወሰዱበት የጊዜ መካከል እድሜያቸው ከ5 ዓመት ወደ 6 ዓመት የሚቀየር ልጆች፡ (1) ዕድሜያቸው ከ 6 ወራት እስከ 5 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደውን የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን፣ ወይም (2) ዕድሜያቸው ከ 6 ዓመት እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀደላቸውን የሞደርና (Moderna) የ COVID-19 ክትባት መውሰድ ይችላሉ።

በመጀመሪያው ዶዝ የወሰዱት ምንም አይነት ዶዝ ቢሆን፣ በሁለት ዶዎች በሚወሰዱበት የጊዜ መካከል እድሜያቸው ከ11 ዓመት ወደ 12 ዓመት የሚቀየር ልጆች፡ (1) ዕድሜያቸው ከ 6 እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደውን የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን፣ ወይም (2) ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀደላቸውን የሞደርና (Moderna) የ COVID-19 ክትባት፣ ወይም (3) SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) መውሰድ ይችላሉ።

² በFDA የተፈቀደው SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) እና በEUA የተፈቀደው ሞደርና (Moderna) እንደ የCOVID-19 ክትባት (ቀይ ከዳን ባለው እና ፈዛዛ ሰማያዊ የመለያ ምልክት በተደረገበት እቃ የሚቀርበው) ምንም አይነት የደህንነት ወይም የውጤታማነት ስጋቶችን ሳያሳዩ ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ለመጀመሪያ ተከታታይ በተቀያይሪነት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

የCOVID-19 ከትባት ለሚከተሉት እንዲሰጥ የFDAን ይህን ድንጋጌ አግኝቷል፡

- ዕድሜያቸው 6 ዓመት እና ዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች በሁለት ደብዳቤ የመጀመሪያ ተከታታይ ከትባት፣ እና
- ዕድሜያቸው 6 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ የሰውነታቸው የበሽታ መከላከል አቅም በተወሰነ ደረጃ የተዳከመ ሰዎች ለሰዎች የመጀመሪያ ተከታታይ ዙር ከትባት ለመስጠት፤

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ከትባት፣ ባይቫለንት/ Bivalent ለሚከተሉት እንዲሰጥ የFDAን ይህን ድንጋጌ አግኝቷል፡

- ዕድሜያቸው 6 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች የየትኛውንም የተፈቀደ ወይም ፍቃድ የተሰጠው የCOVID-19 ከትባት የመጀመሪያውን ከትባት ወስደው ካጠናቀቁ ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ እንደ አንድ አጋዥ ደብዳቤ እንዲሰጥ፣ ወይም
- ዕድሜያቸው 6 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች የየትኛውንም የተፈቀደ ወይም ፍቃድ የተሰጠው የሞናቫለንት³ የCOVID-19 ከትባት በጣም የቅርብ አጋዥ ደብዳቤ ከወሰዱ ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ እንደ አንድ አጋዥ ደብዳቤ እንዲሰጥ።

ይህ የከትባት የመረጃ ቅጽ በአሁኑ ወቅት የCOVID-19 ወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት እርስዎ ወይም ልጅዎ ሊወስዱት ስለሚችሉት ስለ የ SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA)፣ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ከትባት፣ እና ሞደርና የCOVID-19 ከትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ስጋቶችና ጥቅሞችን ለመረዳት የሚረዳዎ መረጃ ይዟል። ጥያቄዎች ካሉዎ የከትባቱን አቅራቢ ያነጋግሩ።

SPIKEVAX (የCOVID-19 ከትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ከትባት፣ እና ሞደርና የCOVID-19 ከትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ሁሉንም ሰው ላይከላከሉ ይችላሉ።

ይህ የመረጃ ቅጽ ማሻሻያ ሊደረግበት ይችላል። በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጽ ለማግኘት እባክዎ www.modernatx.com/covid19vaccine-eua ን ይመልከቱ።

ከትባቱን እርስዎ ወይም ልጅዎ ከመከተላችሁ በፊት ማወቅ ያለብዎ ነገር ምንድን ነው?

COVID-19 ምንድን ነው?

የCOVID-19 በሽታ SARS-CoV-2 ተብሎ በሚጠራ የኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው። ይህ አይነቱ የኮሮና ቫይረስ ከዚህ በፊት ታይቶ አያውቅም። በቫይረሱ ከተያዘ ከሌላ ሰው ጋር ንክኪ በማድረግ ምክንያት በCOVID-19 ሊያዙ ይችላሉ። በሽታው በዋናነት ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቃ የሚችል የመተንፈሻ አካል ህመም ነው። በCOVID-19 የተያዙ ሰዎች ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ ህመም የሚደርሱ የተለያዩ ምልክቶች እንደታዩባቸው ሪፖርት ተደርጓል። ምልክቶቹ ለቫይረሱ ከመጋለጥ በኋላ ከ2 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። ምልክቶቹ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለትን፣ ሳልን፣ የትንፋሽ ማጠርን፣ ድካምን፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመምን፣ አዲስ የሚፈጠር የጣዕም ወይም ሽታ አለመለየትን፣ የጉሮሮ መሰርሰርን፣ የአፍንጫ ፈሳሽ መብዛትን፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስን፣ ተቅማጥን ሊያዙ ይችላሉ።

SPIKEVAX (የCOVID-19 ከትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ከትባት፣ እና ሞደርና የCOVID-19 ከትባት፣ ባይቫለንት/ BIVALENT የሚገናኙት እንዴት ነው?

SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) እና ሞደርና የCOVID-19 ከትባት በተለዋወጡ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።⁴ ሞደርና የCOVID-19 ከትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENT የተዘጋጀው ከ SPIKEVAX እና ሞደርና የCOVID-19 ከትባት ጋር በተመሳሳይ ዘዴ ነው። ነገር ግን በSARS-CoV-2 የአሚክሮን (Omicron) ዝርያ ምክንያት የሚመጣውን የCOVID-19 በሽታን ለመከላከል የሚያገለግል የአሚክሮን (Omicron) ንጥረ ነገር ይይዛል።

ስለ EUA ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በዚህ የመረጃ ቅጽ መጨረሻ ላይ “የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ።

እነዚህን ከትባቶች እርስዎ ወይም ልጅዎ ከመውሰዳችሁ በፊት ለከትባት አቅራቢዎ መግለጽ ያለብዎ ምንድን ነው?

ለከትባት አቅራቢዎ የሚከተሉትን ጨምሮ ስለ ሁሉም የእርስዎ ወይም ልጅዎ የጤና ሁኔታዎች ይነገሩት፡

- የትኛውም አላርጂዎች ካሉብዎ
- ማየካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፕሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) ያለብዎ ስለመሆኑ
- ትኩሳት ካሉብዎ
- የደም መፍሰስ ችግር ወይም የደም መቅጠን ካሉብዎ

³ ሞናቫለንት/Monovalent የትኛውንም የአሪኔኛል የSARS-CoV-2 ብቻ ስጋታዎ ኮሮኒን የሚይዝ ወይም የሚቀይርን የተፈቀደ ወይም ፍቃድ የተሰጠው የCOVID-19 ከትባትን ይገልጻል።

⁴ በFDA የተፈቀደው SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) እና በEUA የተፈቀደው ሞደርና (Moderna) አንድ የCOVID-19 ከትባት (ቀይ ከዳን ባለው እና ፈዛዝ ሰማያዊ የመለያ ምልክት በተደረገበት እቃ የሚቀርበው) ምንም አይነት የደህንነት ወይም የውጤታማነት ስጋቶችን ሳያሳዩ ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ለመጀመሪያ ተከታታይ በተቀያየሪነት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

- የእርስዎ ወይም የልጅዎ በሽታ መከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ ወይም የበሽታ መከላከል ስርአት ላይ ተጽእኖ የሚፈጥር መድሀኒት እየወሰዱ ከሆኑ
- ነፍሱ ጡር ከሆኑ ወይም የማርገዝ አቅድ ካሉዎ
- የሚያጠቡ ከሆነ
- ሌላ የCOVID-19 ክትባት ከወሰዱ
- ከክትባት ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው የነበር ከሆነ

SPIKEVAXን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባትን፣ ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENTን መውሰድ የሌለበት ማን ነው?

በሚከተሉት ሁኔታዎች እርስዎ ወይም ልጅዎ ከእነዚህ ክትባቶች አንዱንም መውሰድ የለባችሁም፡

- ቀደም ሲል የወሰዱትን SPIKEVAXን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA) ወይም ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ዶዝ ከወሰዱ በኋላ ከባድ የአለርጂ አፀፋዊ ምላሽ ካጋጠምዎት፤
- በእነዚህ ክትባቶች በየትኛውም ግብአት ምክንያት ከባድ አለርጂ አጋጥሞ ከነበረ

የእነዚህ ክትባቶች ግብአቶች ምንድን ናቸው?

SPIKEVAX (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ እና ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent የመሚከተሉትን ግብአቶች ይይዛሉ፡ ሜሴንጆር ሪቦኒውሴሊክ አሲድ (mRNA)፣ ሊፒዶች (SM-102, ፖሊቴሊን ግሊኮል [PEG] 2000 ዲሚሪስቶይል ግሊሴሮል [DMG]፣ ኮሌስትሮል እና 1,2-distearoyl-sn-glycerol-3-ፎስፎኮሊን [DSPC])፣ ትሮሜታሚን፣ ትሮሜታሚን ሀይድሮክሎራይድ፣ አሴቲክ አሲድ፣ ሶዲየም አሴቴት ትራይህይድሬት፣ እና ስኳር።

እነዚህ ክትባቶች የሚሰጡት እንዴት ነው?

SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA)፣ ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ እና ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ለእርስዎ ወይም ለልጅዎ በመርፌ መልኩ በጡንቻው ላይ ይሰጠዋል።

የመጀመሪያ ዙር ክትባት: SPIKEVAX (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA) እና ሞደርና የCOVID-19 ክትባት በ1 ወር ጊዜ ልዩነት በሁለት ተከታታይ ዶዞች ይሰጣሉ። የተወሰኑ አይነት የበሽታ መከላከል አቅም ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች ሁለተኛውን ዶዝ ከወሰዱ በኋላ ሰባት ወር የመጀመሪያ ዶዝ ክትባት ሊሰጣቸው ይችላል።

ኢጋዥ ዶዝ: የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/ Bivalent የሚከተለው ከተወሰደ በኋላ ከ2 ወራት በኋላ እንደ አንድ ኢጋዥ ዶዝ ይሰጣል።

- የየትኛውም የተፈቀደ ወይም ፍቃድ የተሰጠው የCOVID-19 ክትባት የመጀመሪያው ክትባት ከተጠናቀቀ በኋላ፣ ወይም
- የየትኛውም የተፈቀደ ወይም ፍቃድ የተሰጠው የሞኖቫለንት የCOVID-19 ክትባት በጣም የቅርብ ኢጋዥ ዶዝ ከተወሰደ በኋላ።

እነዚህ ክትባቶች ከዚህ ቀደም ጥቅም ላይ ውለው ያውቃሉ?

ከታህሳስ 18, 2020 ዓ.ም ጀምሮ በEUA ስር በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆኑ ግለሰቦች የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ወስደዋል። በህክምና ሙከራዎች ወደ 30,000 የሚጠጉ እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች፣ እድሜያቸው ከ 6 ዓመት እስከ 11 ዓመት የሆኑ 4,000 ሰዎች፣ እና እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 5 ዓመት የሆኑ 5,000 ሰዎች የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን በኢንጎል 1 ዱን ዶዝ ወስደዋል።

በህክምና ሙከራ ወቅት ወደ 400 የሚጠጉ እድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች በተለየ የኦሚክሮን/ Omicron ንጥረ ነገር ይዘቱ ከየሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/ Bivalent የሚለየውን የባይቫለንት ክትባት 1 ዶዝ ወስደዋል።

እነዚህ ክትባቶች የሚያስገኝቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው?

SPIKEVAXን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA) እና ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት COVID-19ን እንደሚከላከሉ ታይተዋል። FDA በSARS-CoV-2 የአሚክሮን ዝርያ ምክንያት የሚመጣውን የCOVID-19 በሽታ በተሻለ ሁኔታ ለመከላከል የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/ Bivalent ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል።

የክትባቱ ከCOVID-19 መከላከል የቆይታ ጊዜ በአሁኑ ወቅት አልታወቀም።

የእነዚህ ክትባቶች ስጋቶች ምንድን ናቸው?

እነዚህ ክትባቶች ከባድ የአለርጂ አፀፋዊ ምላሽ ሊያስከትሉ የሚችሉበት በጣም አነስተኛ ዕድል አለ። ከባድ አለርጂ በዋናነት የሚያጋጥመው አንድ ዶዝ ከተወሰደ በኋላ ካሉት ጥቂት ዲቃዎች ጀምሮ እስከ አንድ ሰአት ያክል ነው። በዚህም ምክንያት ክትባት አቅራቢው የክትባቱን ሁኔታ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው እርስዎን ወይም ልጅዎ ክትባቱን በወሰዳችሁበት ቦታ እንድትቆዩ ሊጠይቃችሁ ይችላል። የከባድ አለርጂ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፡

- የመተንፈስ ችግር
- የፊት ወይም ጉሮሮ እብጠት
- የልብ ምት መፍጠን
- ከባድ የሙሉ ሰውነት መንደብደብ
- መደበትና ድካም

ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) በጥቂት SPIKEVAXን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA) ወይም የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን በወሰዱ ሰዎች ላይ የተከሰተ ሲሆን፣ ይህም በአብዛኛው ከሴቶች እና እድሜያቸው ከ74 ወንዶች ይልቅ እድሜያቸው ከ 40 ዓመት በታች በሆኑ አዋቂ ወንዶች ላይ በይበልጥ ተስተውሏል። በእነዚህ አብዛኞቹ ሰዎች ላይ ምልክቶቹ መታየት የጀመሩት የ ክትባቱን ሁለተኛውን ዶዝ ከወሰዱ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነው። ይህ የሚያጋጥምበት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። እርስዎ ወይም ልጅዎ ክትባቱን ከወሰዳችሁ በኋላ የትኛውም የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩባችሁ ወዲያውኑ የህክምና ክትትል ያድርጉ።

- የደረት ህመም
- ትንፋሽ ማጠር
- የፈጣን አተነፋፈስ፣ የልብ መርገብገብ ወይም መውጋት ስሜት

በእነዚህ ክትባቶች የህክምና ሙከራዎች ሪፖርት የተደረጉት የጎረቤት ውጤቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡

- ክትባቱ የሚሰጥበት የሰውነት ክፍል አካባቢ የሚፈጠሩ አሉታዊ ምላሾች፡ ህመም፣ ክትባቱ የሚሰጥበት እጅ የበሽሽት ክፍል መቆጣትና እብጠት፣ እብጠት (የሰውነት መደደር) እና መቅላት
- ጠቅላላ አሉታዊ ምላሾች፡ ድካም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ፣ ትኩሳት፣ እና ሽፍታ

የመጠቀም ፍቃድ መስጠት በኋላ ሪፖርት የተደረጉት የጎረቤት ውጤቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡

- ከባድ አለርጂ
- ዩራቲካሪያ (የሚያሳክ ሽፍታ)
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት)
- ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት)
- ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው ያውቁ ከሆነ

እነዚህ ሁሉም በአንድ ጊዜ የሚያጋጥሙ የእነዚህ ክትባት የጎረቤት ውጤቶች ላይሆኑ ይችላሉ። ከባድና ያልተጠበቁ የጎረቤት ውጤቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እነዚህ ክትባቶች ሊያስከትሏቸው የሚችሏቸው የጎረቤት ውጤቶች አሁንም በመጠናት ናቸው።

የጎረቤት ውጤቶች ካጋጠሙኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

እርስዎ ወይም ልጅዎ ከባድ የአለርጂ አጻፋዊ ምላሽ ካጋጠማችሁ ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም በቅርብዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል ይሂዱ።

እርስዎን/ልጅዎን ስጋት የፈጠሩብዎ ወይም ቶሎ የማይድን የትኛውም የጎረቤት ጉዳዮች ካጋጠማችሁ ለክትባት አቅራቢዎ ወይም ለእርስዎ/ልጅዎ የህክምና እንክብካቤ አቅራቢ ይደውሉ ወይም ከቤት አትውጡ።

የክትባቱን የጎረቤት ውጤቶች ለFDA/CDC የክትባት አሉታዊ ክስተት ሪፖርት ማቅረቢያ ሲሰተም (VAERS) ሪፖርት ያድርጉ። የVAERS የነጻ ጥሪ መስመር 1-800-822-7967 ነው ወይም በአንላይን በ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ሪፖርት ያድርጉ። እባክዎ በሪፖርት ማቅረቢያ ቅጹ በሳፕን #18 ስር በሚገኘው የመጀመሪያው መስመር ላይ እንደአስፈላጊነቱ “SPIKEVAXን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)”፣ “ሞደርና የCOVID-19 ክትባት EUA”፣ ወይም “ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENTን EUA” የሚለውን ያካቱ።

ከዚህ በተጨማሪም የጎረቤት ውጤቶችን ለModernaTX.Inc በ1-866 MODERNA (1-866-663-3762) ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።

በተጨማሪም በ v-safe የሚመዘገቡበት አማራጭም ሊሰጥዎ ይችላል። V-safe የCOVID-19 ክትባትን ከወሰዱ ሰዎች ስላጋጠሟቸው የጎረቤት ውጤቶች ለማረጋገጥ የጽሁፍ መልእክትና የድረገጽ ጥናቶችን የሚጠቀም የፍቃድኝነት ስማርት ስልክን መሰረት ያደረገ መሳሪያ ነው። V-safe ለCDC ስለ COVID-19 ክትባቶች አስተማማኝነት ለመቆጣጠር የሚረዱትን ጥያቄዎች ይጠይቅዎታል። V-safe በተጨማሪም አስፈላጊ ከሆነ የዶዝ ማስታወሻ ይሰጣል እንዲሁም ተሳታፊዎች የCOVID-19 ክትባትን መውሰዳቸውን ተከትሎ ከባድ የጤና ተጽእኖ እንደተፈጠረባቸው ሪፖርት የሚያደርጉ ከሆነ የቀጥተኛ የCDC የስልክ ክትትል ያደርጋል። እንዴት እንደሚመዘገቡ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡ www.cdc.gov/vsafeን ይጎብኙ።

SPIKEVAXን (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባትን፣ ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENTን ለራሴ ላለመውሰድ ወይም ልጄ እንዳይከተብ ብወስን ምን ይሆናል?

በ EUA ስር፣ ክትባቱን ለመውሰድ ለመስማማት ወይም ለመቃወም የቀረበ አማራጭ አለ። እርስዎ ወይም ልጅዎ እነዚህን የትኞቹንም ክትባቶች እንደማትወስዱ የሚወስኑ ከሆነ ይህን ማድረግ የምታገኙትን መደበኛ የህክምና እንክብካቤ አይቀይረውም።

COVID-19ን ለመከላከል በ SPIKEVAX (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENT ምትክ የሚቀርቡ ሌሎች አማራጮች አሉ?

እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዛ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች፣ COVID-19ን ለመከላከል ሌላኛው አማራጭ በFDA የተፈቀደው የኮሚርናቲ COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) የCOVID-19

ክትባት ነው። እድሜያቸው 6 ዓመት እና ከዛ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች የSARS-CoV-2 አሚክሮን/ Omicron ንጥረ ነገርን የሚይዙ የባይቫለንት ክትባቶችን ጨምሮ ሌሎች COVID-19ን የሚከላከሉ ክትባቶች ሊቀርቡ ይችላሉ።

እኔ ወይም ልጄ SPIKEVAX (የCOVID-19 ክትባት፣ mRNA)፣ ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENTን ከሌሎች ክትባቶች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ መውሰድ እንችላለን?

የ SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ወይም የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENTን በተመሳሳይ ጊዜ ከሌላ ክትባት ጋር አብሮ መስጠትን በተመለከተ እስከ አሁን ድረስ ለFDA ዳታ አልቀረበም።

የ SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA)፣ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ወይም ሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/BIVALENTን ከሌላ ክትባት ጋር አብረው ስለመውሰድ ካሰቡ ወይም ልጅዎ እንዲወስድ ካሰቡ በአማራጮቹ ላይ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ወይም ከልጅዎ ጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይወያዩ።

የእኔ ወይም የልጄ በሽታ የመከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ ምን ይሆናል?

የእርስዎ ወይም የልጅዎ የበሽታ መከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ ሰብተኛውን ተከታታይ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ወይም የSPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) ዶዝ ልትወስዱ ትችላላችሁ።

ዕድሜያቸው 6 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች የክትባቱን አጋዥ ዶዝ ከሞደርና የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ጋር አብረው ሊወስዱ ይችላሉ። ክትባቶቹ የበሽታ መከላከል አቅማቸው ለተዳመ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ከCOVID-19 ላይከላከሉ ስለሚችሉ፣ እርስዎ ወይም ልጅዎ COVID-19ን ለመከላከል እንዲረዳዎ አካላዊ ጥንቃቄዎችን መከተላችሁን መቀጠል አለባችሁ። ከእርስዎ ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ሰዎች እንደአስፈላጊነቱ መከተብ አለባቸው።

ነፍሰ ጡርነትን ወይም ማጥባትን በተመለከተ ያለው መረጃ ምንድን ነው?

እርስዎ ወይም ልጅዎ ነፍሰ ጡር ከሆናችሁ ወይም የምታጠቡ ከሆነ ስላሉት አማራጮች ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይወያዩ።

እነዚህ ክትባቶች እኔን ወይም ልጄን በCOVID-19 ሊያሰዙን ይችላሉ?

አይደለም። እነዚህ ክትባቶች SARS-CoV-2 የማይይዙ በመሆኑ እርስዎን ወይም ልጅዎን COVID-19 ሊያሰዙት አይችሉም።


የክትባት ካርድዎን ይያዙ

እርስዎ ወይም ልጅዎ የመጀመሪያውን የCOVID-19 ክትባት ስትወስዱ የክትባት ካርድ ይሰጣችኋል። ተመልሰው በሚመጡበት ወቅት ካርዱን መያዝዎን አይርሱ።

ተጨማሪ መረጃ

ጥያቄዎች ካሉዎ ከዚህ በታች የተገለጸውን ድረገጽ ይጎብኙ ወይም ከታች በተገለጸው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። በጣም የቅርብ የመረጃ

ቅጾችን ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች የቀረበውን የQR ኮድ ስካን ያድርጉ።

የሞደርና (Moderna) Covid-19 ድረገጽ	ስልክ ቁጥር
<p data-bbox="280 1539 722 1570">www.modernatx.com/covid19vaccine-eua</p> 	<p data-bbox="1003 1539 1239 1591">1-866-MODERNA (1-866-663-3762)</p>

ተጨማሪ መረጃ እንዴት አገኛለሁ?

- የክትባት አቅራቢውን ይጠይቁ።
- CDCን በ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> ይጎብኙ።
- FDAን በ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization> ይጎብኙ።
- የግዛትዎን የአካባቢዎን ወይም የማህበረሰብ ጤና መምሪያ ያነጋግሩ።

የክትባት መረጃ የት ይመዘገባል?

ክትባት አቅራቢው የእርስዎን ወይም የልጅዎን የክትባት መረጃ በግዛት/አካባቢ የክትባት መረጃ ሲስተም (IIS) ወይም ሌላ የተመደበ ሲስተም ላይ ሊያካትት ይችላል። ስለ IISዎች የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡ <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>ን ይጎብኙ።

እነዚህን የCOVID-19 ክትባቶች ለማግኘት የመከተሊያ ክፍያ አክፍላለሁ?

አይ። በአሁኑ ወቅት ክትባት አቅራቢው የክትባቱን ዶዝ ለመስጠት ሊያስከፍልዎ የማይችል ከመሆኑም በተጨማሪ የሚወስዱት የCOVID-19 ክትባትን ብቻ ከሆነ ለክትባቱ መውሰጃ ክፍያ ወይም የትኛውም ሌላ ክፍያ ከኪስዎ አይከፍሉም። ሆኖም የክትባት አቅራቢዎች ለክትባቱ ወሳጆች የCOVID-19 ክትባት መስጫ ክፍያዎች ሽፋን ከሚሰጥ ፕሮግራም ወይም እቅድ (የግል የመድን ዋስትና፣ Medicare፣ Medicaid፣ የመድን ዋስትና ላልተገባላቸው ተቀባዮች HRSA COVID-19 Uninsured Program ፕሮግራም) ተገቢውን መልሶ ክፍያ ሊጠይቁ ይችላሉ።

የሚጠረጠሩ የማጭበርበር ጉዳዮችን የት ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?

የCDC የCOVID-19 ክትባት ፕሮግራም መስፈርቶች ላይ ስለሚፈጸሙ ስለ የትኛውም ጥሰቶች የሚያውቁ ግለሰቦች እነዚህን ለዩኤስ የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ፣ የዋና መርማሪ ጽ/ቤት በ1-800-HHS-TIPS ወይም TIPS.HHS.GOV ሪፖርት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ።

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም ምንድን ነው?

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም (CICP) እነዚህን ክትባቶች ጨምሮ በተወሰኑ መድሀኒቶች ወይም ክትባቶች የተነሳ ከባድ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች የሚከፍሏቸው የህክምና እንክብካቤ ወጪዎች እና ሌሎች ልዩ ወጪዎች እንዲከፈሏቸው የሚያግዝ የፌደራል ፕሮግራም ነው። በጠቅላላው የካሳ ጥያቄው ክትባቱ ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ (1) አመት ውስጥ ለCICP መቅረብ አለበት። ስለዚህ ፕሮግራም የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት www.hrsa.gov/cicp/ ን ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-855-266-2427 ይደውሉ።

የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?


የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) እንደ የወቅቱ የCOVID-19 ወረርሽኝ የመሳሰሉ የማህበረሰብ ጤና አስቸኳይ ሁኔታዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት ክትባቶችን ጨምሮ የህክምና ምርቶች እንዲቀርቡና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚያመቻች አሰራር ነው። EUA በCOVID-19 ወረርሽኝ ቆይታ ውስጥ ለአስቸኳይ ጊዜ መድሀኒቶችን እና የባዮሎጂካል ምርቶችን ለመጠቀም አሳማኝ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ይህን በሚፈቅደው የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች ጽ/ቤት (HHS) መግለጫ ድጋፍ አግኝቷል። በአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ የተሰጠው ምርት ከ FDA ፍቃድ ካገኘ ምርት ጋር በ FDA አንድ አይነት የግምገማ ሂደት አይደረግለትም።

FDA የተወሰኑ መስፈርቶች ሲሟሉ EUA ሊሰጥ የሚችል ሲሆን መስፈርቶቹ በቂ፣ የተፈቀዱ፣ ዝግጁ አማራጮች አለመገኘትን ይይዛሉ። በተጨማሪም የFDA ውሳኔ በሚቀርቡለት ምርቱ በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት ወቅት COVID-19ን ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል እና የምርቱ የታወቀ ሊሰሩ የሚችሉ ጥቅሞችን እና ከምርቱ የታወቀ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶች ይልቅ ጥቅሞቹ እንደሚያመዘኑ በሚያሳዩ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ይመሰረታል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ምርቱ ጥቅም ላይ እንዲውል እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች መሟላት አለባቸው።

ካልተቋረጠ ወይም ካልተሻረ በስተቀር (ይህ ከሆነ ግን፣ ከዚያን ጊዜ በኋላ ምርቱ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም)፣ የ ኮቪድ-19 የ EUA አስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ አሰፈላጊነት እስካለ ድረስ፣ የዚህን ምርት EUA ተግባራዊ እንደሆነ የሚቆይ ይሆናል።

Moderna US, Inc. Cambridge, MA
02139

©2022 ModernaTX, Inc. ሙብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የፈጠራ ባለቤትነት(ቶች)፡ www.modernatx.com/patents የተሻሻለበት ቀን፡ ታህሳስ/8/2022 ዓ.ም



ይህ የመረጃ ቅጽ ለኤሌክትሮኒክ የሕክምና መረጃዎች/የክትባት የመረጃ ሲስተሞች ለክትባት ተቀባዩ የቀረበ መሆኑን ለማረጋገጥ ስኬት ያድርጉ።

GDTI: 0886983000349