

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВАКЦИНЫ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ  
COMIRNATY («Ко-мир-на-ти»)  
(ВАКЦИНА ОТ COVID-19, мРНК)  
(формула 2023-2024 гг.)**

Данный справочный материал не является заменой консультации с вашим поставщиком медицинских услуг. Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг.

**Что такое COMIRNATY?**

COMIRNATY — это вакцина, предназначенная для применения в возрасте 12 лет и старше с целью защиты от COVID-19.

Вакцина COMIRNATY может защитить не всех.

COMIRNATY не содержит SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий заболевание COVID-19. Вы не можете заразиться COVID-19 от вакцины COMIRNATY.

**Кому не следует получать вакцину COMIRNATY?**

Вам не следует получать вакцину COMIRNATY в случае:

- тяжелой аллергической реакции на полученную ранее дозу COMIRNATY или любой вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19<sup>1</sup>
- отмеченной ранее тяжелой аллергической реакции на любые ингредиенты этих вакцин (см. **Какие ингредиенты входят в состав COMIRNATY?**).

**Перед получением COMIRNATY сообщите организации, осуществляющей вакцинацию, о всех имеющихся у вас заболеваниях или особых состояниях здоровья, в том числе в случае:**

- аллергии
- тяжелой аллергической реакции на полученную ранее дозу любой вакцины от COVID-19
- перенесенного миокардита (воспаление сердечной мышцы) или перикардита (воспаление сердечной оболочки)
- высокой температуры
- нарушения свертываемости крови или приема противосвертывающего препарата
- ослабленного иммунитета или приема лекарств, влияющих на иммунную систему
- беременности или ее планирования
- кормления грудью
- получения другой вакцины от COVID-19
- потери сознания в прошлом в результате инъекции

**Как вводится вакцина COMIRNATY?**

Вакцина COMIRNATY вводится в виде внутримышечной инъекции.

<sup>1</sup> COMIRNATY (формула 2023-2024 гг.) изготавливается так же, как вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 (оригинальная моновалентная) и бивалентная вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19, но при этом она кодирует спайк-белок субварианта ХВВ.1.5 омикрон-штамма SARS-CoV-2 (омикрон ХВВ.1.5).

## **Каковы возможные риски, связанные с вакциной COMIRNATY?**

Существует небольшая вероятность того, что COMIRNATY может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Тяжелая аллергическая реакция обычно возникает в интервале от нескольких минут до 1 часа после введения дозы вакцины. По этой причине организация, осуществляющая вашу вакцинацию, может попросить вас остаться в том месте, где вы получили вакцину, для наблюдения после вакцинации. Признаки тяжелой аллергической реакции могут быть следующими:

- Затрудненное дыхание
- Отечность лица и горла
- Учащенное сердцебиение
- Обильная сыпь по всему телу
- Головокружение и слабость

Миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца) возникли у некоторых людей, получивших мРНК-вакцины от COVID-19, включая COMIRNATY и вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. После получения COMIRNATY миокардит и перикардит чаще всего возникали у подростков мужского пола в возрасте от 12 до 17 лет. У большинства из них симптомы появлялись в течение нескольких дней после вакцинации. Вероятность того, что это произойдет, очень мала. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас или вашего ребенка возникнут какие-либо из следующих симптомов после вакцинации, особенно в первые 2 недели после получения дозы вакцины:

- Грудная боль
- Одышка
- Ощущение учащенного, нерегулярного или усиленного сердцебиения

Побочные эффекты, о которых сообщалось в связи с использованием COMIRNATY или вакцин Pfizer-BioNTech COVID-19, включают:

- Тяжелые аллергические реакции
- Нетяжелые аллергические реакции, такие как сыпь, зуд, крапивница или отечность лица
- Миокардит (воспаление сердечной мышцы)
- Перикардит (воспаление оболочки сердца)
- Реакции в месте инъекции: боль, отек, покраснение, боль в руке
- Общие побочные эффекты: усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, боль в суставах, жар, тошнота, плохое самочувствие, увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия), снижение аппетита, диарея, рвота, головокружение
- Обморок в связи с введением вакцины

Этот перечень побочных эффектов от применения вакцины COMIRNATY может оказаться не полным. Спросите у своего поставщика медицинских услуг о любых побочных эффектах, которые вас беспокоят.

Сообщайте о побочных эффектах вакцины в Систему отчетов о нежелательных реакциях FDA/CDC (VAERS). Бесплатный номер VAERS: 1-800-822-7967. Также можно сообщить онлайн по адресу: <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>.

Кроме того, вы можете сообщить о побочных эффектах в Pfizer Inc. по телефону 1-800-438-1985 или на сайте [www.pfizersafetyreporting.com](http://www.pfizersafetyreporting.com).

## **Что делать в случае беременности или кормления грудью?**

Если вы беременны или кормите грудью, обсудите возможные варианты с вашим лечащим врачом.

## Какие ингредиенты входят в состав COMIRNATY?

В состав вакцины COMIRNATY входят следующие ингредиенты:

- матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК)
- липиды (((4-гидроксибутил) азандиил) бис (гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеcanoат), 2 [(полиэтиленгликоль)-2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин и холестерин)
- трометамин
- гидрохлорид трометамина
- сахароза

COMIRNATY не содержит консервантов.

Данная информация для получателей вакцины и ухаживающих за ними лиц может обновляться. Ознакомьтесь с последней версией этого справочного материала можно на веб-сайте <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/>.

Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, посетите сайт [www.COMIRNATY.com](http://www.COMIRNATY.com) или позвоните по телефону 1-877-VAX-CO19 (1-877-829-2619).

## BIONTECH

Произведено для:

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Germany



Произведено:

Pfizer Inc., New York, NY 10001

LAB-1587-1.0

Лицензия правительства США № 2229

Последняя редакция: 09/2023