

接种者和护理者须知
复必泰 (Cuh-mir'-na-tee) (COVID-19 mRNA疫苗)
(2024-2025年配方)

本摘要无法取代与医疗护理机构之间的交流。如有任何疑问或者需要更多信息，请咨询您的医疗护理机构。

复必泰是什么？

复必泰 (COMIRNATY) 是一种用于12岁及以上人群预防COVID-19的疫苗。

复必泰并非对所有接种者都具有保护作用。

复必泰不含导致COVID-19的SARS-CoV-2病毒，复必泰不会导致您感染COVID-19。

哪些人不宜接种复必泰？

如果您有以下情况，请勿接种复必泰：

- 先前接种复必泰或任何辉瑞COVID-19疫苗后出现严重过敏反应。
- 对这些疫苗中的任何成分有严重过敏反应（见[复必泰疫苗含有哪些成分？](#)）。

接种复必泰前，应告知疫苗接种机构您的所有医疗病症，包括是否有以下情况：

- 任何过敏
- 既往接种任何COVID-19疫苗后出现过严重的过敏反应
- 曾患有心肌炎（心肌发炎）或心包炎（心脏外层包膜发炎）
- 发热
- 出血性疾病或正在服用抗凝药
- 免疫力低下或正在服用影响免疫系统的药物
- 怀孕或正计划怀孕
- 正在母乳喂养
- 已接种其他COVID-19疫苗
- 曾因注射而晕厥

复必泰采用哪种接种方式？

复必泰采用肌肉注射方式。

接种复必泰有哪些可能风险？

复必泰有极小的可能性会引起严重过敏反应。严重过敏反应通常会在疫苗接种后数分钟至一小时内发生。因此，疫苗接种机构可能会要求您留在疫苗接种地点，接受疫苗接种后的监测。严重过敏反应的症​​状可能包括：

- 呼吸困难
- 脸部及喉咙肿胀
- 心跳加速
- 全身严重皮疹
- 头晕和虚弱

一些人接种COVID-19 mRNA疫苗（包括复必泰和辉瑞COVID-19疫苗）后出现了心肌炎（心肌炎症）和心包炎（心脏外膜炎）接种复必泰后出现心肌炎和心包炎的情况最常见于12-17岁的青少年男性。在大多数个体中，症状在疫苗接种后几天内开始出现。出现此类症状的可能性非常低。如果您或您的孩子在接种疫苗后出现以下任何症状，请立即就医，尤其是在接种一剂疫苗后的2周内：

- 胸痛
- 气短
- 心跳加快、心慌或感觉心脏砰砰跳

据报告，复必泰或辉瑞COVID-19疫苗的副作用包括：

- 严重过敏反应
- 非严重的过敏反应，例如皮疹、瘙痒、荨麻疹或面部肿胀
- 心肌炎（心肌炎症）
- 心包炎（心脏外层包膜炎症）
- 注射部位反应：疼痛、肿胀、发红、手臂疼痛
- 一般副作用：疲劳、头痛、肌肉痛、寒战、关节痛、发烧、恶心、感觉不适、淋巴结肿大（淋巴结病变）、食欲减退、腹泻、呕吐、头晕
- 与注射疫苗相关的昏厥

这些可能不是复必泰的所有可能副作用。向您的医疗保健机构询问您担心的任何副作用。

向“FDA/CDC疫苗不良事件报告系统（VAERS）”报告疫苗副作用。VAERS免费电话：1-800-822-7967；或通过<https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>在线报告。

此外，您可以向辉瑞公司报告副作用，电话：1-800-438-1985，网址：

www.pfizersafetyreporting.com。

如果您是孕妇或正在哺乳期怎么办？

如果怀孕或处于哺乳期，请与您的医疗保健机构讨论您的选择。

复必泰中含有哪些成分？

复必泰中含有以下成分：

- 信使核糖核酸（mRNA）
- 脂质（（4-羟丁基）氮杂二基）双（己烷-6,1-二基）双（2-己基癸酸酯）、2[（聚乙二醇）-2000]-N,N-二十四烷基乙酰胺、1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱和胆固醇）
- 氨丁三醇
- 盐酸氨丁三醇
- 蔗糖

复必泰不含防腐剂。

本《接种者和护理者须知》可能已更新。有关《接种者和护理者须知》的最新信息，请访问

<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/>。

如有任何疑问，请联系您的医疗保健机构或者访问www.COMIRNATY.com，或致电1-877-VAX-CO19（1-877-829-2619）。

BIONTECH

制造委托方：

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Germany



制造商：

Pfizer Inc., New York, NY 10001

LAB-1587-3.0

美国政府许可证编号2229

修订日期：2024年8月